

OCULOPLÁSTICA E ÓRBITA

08:50 | 11:00 - Sala Lira

Mesa: João Cabral, Maria Araújo, Sandra Prazeres

CL69 - 08:50 | 09:00**CORRECÇÃO DA TRIQUÍASE SEM ENTRÓPION DA PÁLPEBRA INFERIOR ATRAVÉS DE RESSECÇÃO LAMELAR ANTERIOR E SUTURAS EVERSORAS**

Sílvia Mendes; Miguel Castro; Diana Beselga; Joana Campos; Arminda Neves; Marilyn Machado;
João Paulo Castro de Sousa
(Centro Hospitalar Leiria-Pombal)

Objectivo

Descrever os métodos e resultados do tratamento da triquíase sem entrópion com ressecção lamelar anterior e incisão ao nível da linha cinzenta

Métodos

Seis doentes com triquíase sem entrópion da pálpebra inferior, com tarso saudável e sem cicatrização foram submetidos a ressecção lamelar anterior. Uma elipse de músculo e pele foram excisados da pálpebra inferior com dissecção até às raízes dos cílios, e foram colocadas suturas de seda 4-00 de forma a everter os cílios. A pele foi suturada com seda 6-00. Depois, foi feita uma incisão na linha cinzenta com cerca de 1 mm de profundidade.

Resultados

Este procedimento foi efectuado na pálpebra inferior de 6 doentes (4 sexo feminino e 2 masculino). Os doentes foram seguidos durante 6 a 12 meses. Não foi registada nenhuma recorrência durante este período. Não se observaram efeitos secundários.