

## OCULOPLÁSTICA E ÓRBITA

08:50 | 11:00 - Sala Lira

Mesa: João Cabral, Maria Araújo, Sandra Prazeres

CL71- 09:10 | 09:20

**RECONSTRUÇÃO DA PÁLPEBRA SUPERIOR COM RETALHO DE CUTLER-BEARD MODIFICADO**Ana Melo Cardoso<sup>1</sup>; João Goulão<sup>2</sup>; João Alves<sup>2</sup>; João Cardoso<sup>1</sup>; Nadine Marques<sup>1</sup>; Ana Miranda<sup>1</sup>; Mafalda Pereira<sup>1</sup>; Nuno Campos<sup>1</sup>

(1-Hospital Garcia de Orta; 2-Serviço de Dermatologia, Hospital Garcia de Orta)

**Introdução**

O retalho de Cutler-Beard (ou retalho em ponte) é uma técnica usada habitualmente para reconstruir grandes defeitos da pálpebra superior (envolvimento  $\geq 75\%$ ). Envolve 2 estádios cirúrgicos (habitualmente separados por 4 a 6 semanas), realizando-se retalho de avanço cutâneo-conjuntivo da pálpebra inferior para a superior. A retração e entrópio representam complicações comuns. Como forma de as evitar, o tarso superior pode ser substituído por cartilagem do pavilhão auricular ou fásia lata. Neste trabalho, os autores usaram o retalho de Cutler-Beard acoplado a enxerto autólogo de cartilagem do septo nasal e pavilhão auricular.

**Material e Métodos**

Este é um estudo retrospectivo de dois doentes com neoplasia maligna da pálpebra superior. A excisão com margens adequadas condicionou um grande defeito cirúrgico ( $\geq 90\%$ ), com necessidade de reconstrução total da pálpebra superior. Um dos doentes tinha um porocarcinoma da pálpebra superior, sendo utilizado para reconstrução palpebral o retalho de Cutler-Beard com colocação de enxerto livre de cartilagem do septo nasal. O outro doente tinha um carcinoma espinocelular, utilizando-se retalho de Cutler-Beard com enxerto livre de cartilagem auricular esquerda em "sandwich". O exame histopatológico das peças cirúrgicas confirmou a excisão completa dos tumores. Não se verificaram recidivas tumorais obtendo-se bom resultado estético e funcional.

**Conclusão**

A reconstrução cirúrgica de grandes defeitos da pálpebra superior é complexa e desafiante. Os autores apresentam uma alternativa de reconstrução utilizando uma modificação do retalho de Cutler-Beard que permite restaurar a anatomia da pálpebra de forma a impedir a formação de entrópio ou retração.

**Bibliografia**

1. Kanski J. (2007). Clinical Ophthalmology, A Systematic Approach. 6<sup>th</sup>. Elsevier
2. Leatherbarrow B. (2011). Oculoplastic Surgery, 2<sup>th</sup>. Informa healthcare. London
3. Rajeev J, Venkatesh C. Eccrine Porocarcinoma of Upper Eyelid. Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery; Vol. 24, No. 3, pp. 218–243
4. Craig N. Czyz, DO, FACOS, Kenneth V. Cahill, Jill A. Foster. Reconstructive designs for the eyelids. Operative Techniques in Otolaryngology (2011) 22, 35-46
5. Brusati R, Colletti G, Redaelli V. Upper eyelid reconstruction with forehead galeal flap. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009; 901-905