

OCULOPLÁSTICA E ÓRBITA

08:50 | 11:00 - Sala Lira

Mesa: João Cabral, Maria Araújo, Sandra Prazeres

CL77- 10:10 | 10:20**PTOSE SUPRACILIAR: ELEVAÇÃO DIRETA E TRANSBLEFAROPLASTIA**Rita Matos¹; Nádia Lopes¹; Guilherme Castela²; Joana Pires¹; Mariana Cardoso¹

(1-Departamento de Oftalmologia, Centro Hospitalar Baixo Vouga; 2-Departamento de Oftalmologia, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra)

Introdução:

A ptose supraciliar resulta na maioria dos casos de um processo de envelhecimento ou complicação da paresia do VII par craniano.

Existem várias técnicas para a sua correção: browlift por via endoscópica, via direta, e abordagem via transblefaroplastia.

Este trabalho tem como finalidade descrever as duas técnicas não endoscópicas utilizadas na correção da ptose supraciliar.

Material e métodos:

Os autores descrevem casos clínicos em que foram utilizadas técnicas cirúrgicas não-endoscópicas: elevação direta do supracílio e abordagem por transblefaroplastia.

Na elevação direta do supracílio marca-se inicialmente a pele a ser excisada e procede-se à sua excisão e sutura.

Na transblefaroplastia a incisão cutânea é realizada na prega palpebral superior, faz-se dissecação do músculo orbicular até o rebordo orbitário superior, procedendo-se de seguida à fixação do supracílio.

Resultados:

Foram obtidos resultados estéticos satisfatórios, que foram determinados pela simetria e altura do supracílio.

Conclusão:

A elevação direta do supracílio e a transblefaroplastia são técnicas cirúrgicas seguras e eficazes que permitem alcançar um resultado funcional e estético satisfatório para o doente. A transblefaroplastia é um bom método para os doentes que também desejam uma blefaroplastia da pálpebra superior.

A técnica cirúrgica eleita vai depender do grau de ptose, da sua etiologia e presença de blefarocalásia.

Para além disso, são técnicas que permitem a correção da ptose supraciliar apenas recorrendo ao equipamento standard de oculoplástica, sem a necessidade de equipamento endoscópico.

Bibliografia:

1. A.G. Tyers, FRCS FRCOphth. Brow-lift via the direct and trans-blepharoplasty approaches. Orbit 2006, 25:261–265.
2. A. J. Booth, A. Murray, A. G. Tyers. The direct brow lift: efficacy, complications, and patient Satisfaction. Br J Ophthalmol 2004;88:688–691.
3. Mark A. Codner, Don O. Kikkawa, Bobby S. Korn, Salvatore J. Pacella, Blepharoplasty and Brow Lift. Plastic and Reconstructive Surgery 2010, 126: 1e.