

14:30 | 16:30 - Sala Lince

Mesa: João Paulo Castro Sousa, Cristina Brito, Miguel de Pinho Gomes

Po104- 15:05 | 15:10**DESCOLAMENTO MACULAR SEROSO BILATERAL COMO SINAL DE APRESENTAÇÃO DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA**

Luisa Vieira¹; Nuno Silva²; Maria Lisboa²; André Vicente²; Ana Cabugueira¹; Rita Flores²; Vitor Maduro²
(1-Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada; CHLC; 2-Centro Hospitalar Lisboa Central)

Introdução

A leucemia linfoblástica aguda é uma neoplasia maligna das células hematopoiéticas, incomum em adultos, na qual os precursores linfóides proliferam e substituem as células hematopoiéticas normais na medula óssea. Apesar da maioria dos casos apresentar alterações no fundo ocular no decurso da doença, as alterações oftalmológicas são raramente forma de apresentação da mesma.

Objetivo

Descrever um caso de descolamento macular seroso bilateral como sinal de apresentação de leucemia linfoblástica aguda num adulto.

Métodos

Uma avaliação oftalmológica e sistémica completa foi efetuada numa doente de 63 anos que recorreu ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Lisboa Central por diminuição da acuidade visual (AV), com 2 semanas de evolução.

Resultados

Descreve-se o caso de uma doente com diminuição progressiva e indolor da acuidade visual (OD 2/10 e OE 3/10), que apresentava concomitantemente febre e adenopatias cervicais, com duas semanas de evolução. À oftalmoscopia apresentava descolamento seroso macular bilateral, confirmado por tomografia de coerência ótica (espessura macular central OD 638µm e OE 423µm). A angiografia fluoresceínica revelou somente pequenas lesões hiperfluorescentes tipo pinpoints no polo posterior. Nos tempos médios e tardios do exame adivinham-se os limites da bolsa do descolamento do neuroepitélio do OD. As alterações encontradas no hemograma suscitaram um estudo sistémico mais extenso. O diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda B (CD10+) foi efetuado, tendo-se iniciado, de imediato, quimioterapia sistémica intensiva.

Conclusões

Este caso ilustra a importância do estudo sistémico face a um descolamento seroso macular bilateral, sem outros sinais sugestivos de afecção local, mesmo num doente adulto. Tal é particularmente importante quando o início precoce do tratamento é imperativo e dele depender a sobrevivência do doente.

Bibliografia:

- Reddy SC, Jackson N, Menon BS. Ocular involvement in leukemia--a study of 288 cases. *Ophthalmologica*. 2003 Nov-Dec;217(6):441-5.
- Yoshida A et al. Serous retinal detachment in an elderly patient with Philadelphia-chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Am J Ophthalmol* 2005 Feb;139(2):348-9.
- Seiter K. Acute lymphoblastic leukemia. Disponível em <http://emedicine.medscape.com/article/207631-overview>