

17:00 | 18:00 - Sala Lince

Mesa: João Chibante-Pedro, Teresa Quintão, Luís Figueira

PO56 - 17:05 | 17:10**TRATAMENTO DO “KISSING NEVUS” DA PÁLPEBRA – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO**

Sidnei Barge; Monica Loureiro; Sandra Prazeres; Luis Agrelos
(Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/Espinho)

Introdução

Os autores apresentam um caso de nevo dividido da pálpebra pela sua raridade e variedade de opções terapêuticas.

Caso Clínico

Doente do sexo masculino, 61 anos, sem antecedentes oftalmológicos ou sistémicos, recorreu à consulta por nevo dividido da pálpebra superior e inferior do olho esquerdo (OE) desde o nascimento.

No exame oftalmológico do OE apresentava uma acuidade visual de 10/10 e a biomicroscopia mostrava lesão pigmentada, espessa e volumosa no terço lateral da pálpebra superior esquerda (PSE) e lesão pigmentada e exofítica no terço lateral da margem palpebral inferior. O exame oftalmológico do olho direito era normal. O doente foi submetido a excisão pentagonal do terço lateral que envolvia a maior parte da lesão da PSE associada a reinserção da aponevrose do músculo levantador da pálpebra superior por via conjuntival. A lesão da pálpebra inferior esquerda foi removida por “shaving”. A histologia demonstrou tratar-se de um nevo melânico intra-dérmico. Posteriormente e para melhorar o aspecto estético, as lesões palpebrais remanescentes foram tratadas com laser argon. Obteve-se um bom resultado estético e funcional.

Discussão/Conclusão

O nevo dividido ou “Kissing nevus” é um nevo congénito raro que se desenvolve durante o período embrionário e que se divide durante a separação palpebral. A maioria dos nevos são de tamanho médio e raramente afetam a conjuntiva. Além dos problemas estéticos, estas lesões podem provocar ptose, ectrópio e epífora. O tratamento cirúrgico e médico é variado e deve ser individualizado de acordo com a idade do doente, extensão e tamanho da lesão.

Bibliografia

Desai SC, Walen S, Holds JB et al. *Divided nevus of the eyelid: review of embryology, pathology and treatment*. Am J Otolaryngol 2013; May-Jun;34(3):223-9.

Papadopoulos O, Chrisostomidis C, Konofaos P et al. *Divided naevus of the eyelid, seven cases*. J Plast Reconstr Aesthet Surg; 2007;60(3):260-5.

Choi J, Lee Y. *Bipedicled Skin Flap in the Treatment of Divided Nevus of the Eyelid*. Dermatol Surg 2013 Jul 23.

Yildirim N, Sahin A, Erol N. *The surgical treatment of congenital divided nevus of the eyelid: a case report and review of the literature*. Int Ophthalmol 2009 Feb;29(1):45-7.