

09:00 | 11:00 - Sala Vega

Mesa: António Ramalho, Luís Torrão, Joaquim Canelas

**VD8 - 10:10 | 10:20****MIOPEXIA DO RECTO SUPERIOR – TÉCNICA CIRÚRGICA**Paulo Freitas-da-Costa<sup>1</sup>; Jorge Breda<sup>2</sup>; Augusto Magalhães<sup>2</sup>

(1-Departamento de Oftalmologia, Centro Hospitalar de S. João; Departamento Anatomia, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 2-Departamento de Oftalmologia, Centro Hospitalar de S. João)

**Introdução:**

A miopexia retro-equatorial do músculo recto superior é uma cirurgia utilizada, na Unidade de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo do Serviço de Oftalmologia do Hospital de São João, em casos selecionados de desvios verticais. É objectivo dos autores descrever esta técnica cirúrgica.

**Métodos:**

Descrição da técnica cirúrgica.

**Resultados:**

Técnica cirúrgica: 1) abertura límbica da conjuntiva superior; 2) identificação e exposição do recto superior; 3) isolamento do tendão do oblíquo superior; 4) passagem dos fios de Cüppers a 14 mm da inserção do recto superior 4) lavagem com gentamicina; 5) sutura da conjuntiva.

**Conclusões:**

A miopexia do recto superior é uma opção cirúrgica eficaz, com bons resultados em alguns tipos de desvios verticais.